

Programme
principal

25
ANS
Congrès du CMPR



LES CONTRAIRES

chercher trouver

15 juin 2023 – Beaulieu Lausanne

**25^{ème} Colloque de formation continue du
Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR)**



cmpr-congres.ch



mfe

Haus- und Kinderärzte Schweiz
Médecins de famille et de l'enfance Suisse
Medici di famiglia e dell'infanzia Svizzera



KHM CMPR CMB
KOLLEGIUM FÜR HAUSARZTMEZIZIN
COLLEGE DE MÉDECINE DE PREMIER RECOURS
COLLEGIO DI MEDICINA DI BASE

EN CAS DE COVID ENVISAGEZ PAXLOVID®^{1,2}



☑ Recommandé par la SSI en première ligne pour le traitement précoce, afin de prévenir une évolution vers une forme sévère de la COVID-19 chez les patientes et patients à risque.²

SSI: Société Suisse d'Infectiologie

Le test et les comprimés représentés ne sont pas conformes aux dimensions originales.

1. Paxlovid® (nirmatrelvir [PF-07321332] et ritonavir): information professionnelle actuelle sur www.swissmedicinfo.ch
2. Société Suisse d'Infectiologie (SSI). Recommandations de la Société Suisse d'Infectiologie (SSI) concernant le traitement précoce et la prophylaxie de la COVID-19, 6 février 2023. À consulter sur https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid19_vo_2.html#-411791961, dernière consultation: 24.03.2023.

Les références sont disponibles sur demande.

Paxlovid® Comprimés pelliculés (nirmatrelvir [PF-07321332]) et comprimés pelliculés (ritonavir). **Indications:** Traitement de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) chez les adultes qui n'ont pas besoin d'oxygénothérapie ou d'hospitalisation en raison de la COVID-19 et qui présentent un risque accru d'évolution vers une forme sévère de la COVID-19. **Posologie:** 300 mg de nirmatrelvir [PF-07321332] et 100 mg de ritonavir pris en même temps toutes les 12 h pendant 5 j. Chez les patients présentant des troubles modérés de la fonction rénale (DFGe ≥ 30 - <60 ml/min), 150 mg de nirmatrelvir [PF-07321332] et 100 mg de ritonavir pris en même temps toutes les 12 h pendant 5 j. **Contre-indications:** Association avec des médicaments dont la clairance dépend fortement du CYP3A4, et association avec des inducteurs puissants du CYP3A4, voir tableau des interactions dans l'information professionnelle du médicament. Hypersensibilité à l'un des composants. **Mises en garde et précautions:** Risque d'effets indésirables graves en raison d'interactions avec d'autres médicaments. Surdosage avec toxicité potentielle chez les patients présentant des troubles sévères de la fonction rénale. Troubles sévères de la fonction hépatique. Hépatotoxicité. Risque de résistance du VIH-1. Contient du sodium et du lactose monohydraté. **Interactions:** Potentiel d'interactions considérable en raison de l'inhibition du CYP3A4 et du CYP2D6 ainsi que de l'inhibition de la glycoprotéine P et de la forte affinité pour le CYP2C9. Nombreuses interactions et effet de Paxlovid sur la pharmacocinétique d'autres médicaments, voir tableau des interactions dans l'information professionnelle du médicament. Les médicaments qui induisent le CYP3A4 peuvent diminuer la concentration plasmatique du nirmatrelvir [PF-07321332] et du ritonavir, et réduire leur effet thérapeutique. **Effets indésirables:** Hypersensibilité, dysgueusie, céphalées, diarrhée, vomissements, e. a. **Présentation:** 30 comprimés pelliculés, correspondant à 5 doses quotidiennes. Catégorie de vente: A. **Titulaire de l'autorisation:** Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich. Pour de plus amples renseignements, consulter l'information professionnelle du médicament sur www.swissmedicinfo.ch. (V004)

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire. Pour de plus amples informations, consulter l'information professionnelle/l'information destinée aux patients de Paxlovid sur www.swissmedicinfo.ch.

PP-PAX-CHE-0212 Mar 2023

Bienvenue

Chères et Chers Collègues,

Le 25^{ème} Colloque de formation continue du collège de médecine de Premier Recours (CMPR) placé sous la devise « **CHERCHER – TROUVER** » se tiendra le **15 juin 2023** au Palais Beaulieu de Lausanne.

Cet événement réunit chaque année un nombre toujours croissant de médecins de famille et de pédiatres acquis à la cause de l'excellence de cette formation continue. Le CMPR propose en effet des interventions riches, variées et toujours d'une grande actualité. Son programme 2023 s'articule autour de la thématique du diagnostic dans tous les domaines d'expertise couverts par la médecine de premier recours.

La recherche des causes n'est-elle pas un aspect essentiel de notre activité ? Si vous avez parfois l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin, ce congrès vous apportera de précieuses réponses. Il vous enrichira également de réflexions capitales sur notre profession, « une médecine de famille qui se (re)cherche » et posera la question des « diagnostics par intelligence artificielle : meilleurs que les médecins de famille ? ».

Des séminaires interactifs enrichissants vous permettront d'embrasser les thèmes variés qu'englobe la médecine de premier recours, notamment les troubles du développement, les dépendances à l'âge adolescent, les douleurs articulaires ou l'hypertension résistante, de même que les traitements des céphalées et la question du post-covid.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous rencontrer à Lausanne et de vivre ensemble une journée de formation enrichissante et instructive.

Votre comité d'organisation



Dre méd.
Cannelle Broquet Ducret
Pédiatrie
Saignelégier



Prof. Dr méd.
Idris Guessous
Médecine interne générale
Genève



Dr méd.
Michaël Klay
Médecine interne générale
Oron-la-Ville



Prof. Dr méd.
Jacques Cornuz
Médecine interne générale
Lausanne



Dr méd.
François Héritier
Médecine interne générale
Courfaivre



Prof. Dr méd.
Nicolas Senn
Médecine interne générale
Lausanne



Dre méd.
Marjorie Cosandey Tissot
Médecine interne générale
La Chaux-de-Fonds



Dre méd.
Sabine Indermaur
Pédiatrie
Sierre

Un cas évident d'insuffisance cardiaque, n'est-ce pas ?

Ces symptômes pourraient-ils cacher une **cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine (ATTR-CM*)** potentiellement mortelle ?

- Souffre d'insuffisance cardiaque¹
- Réponse insuffisante au traitement standard, comme les bêtabloquants¹
- Syndrome du canal carpien bilatéral¹

AGISSEZ RAPIDEMENT

Faites passer un examen cardiologique approfondi à vos patients présentant une suspicion d'ATTR-CM² – **L'ATTR-CM* peut être traitée par Vyndaqel®.**³

MARTIN
65 ANS
*Exemple fictif
de patient*



LES CONTRAIRES
chercher trouver

Programme scientifique

Jeudi 15 juin 2023

Dès 07h30	Enregistrement
08h00 – 08h45	Symposium satellite du matin 1 et 2
09h10 – 09h15	Début du congrès François Héritier, Courfaivre
09h15 – 10h00	Exposé principal 1 Quand la médecine de famille se (re)cherche Nicolas Senn, Lausanne / Idris Guessous, Genève
10h15 – 11h15	Séminaires interactifs A
A1	Vaccins : trouver le bon moment Amel Filali, Lausanne / Cannelle Broquet, Saignelégier
A2	Chercher des liens et établir un diagnostic sans dermatologue Shireen Dumont, Genève / Idris Guessous, Genève
A3	Chercher l'ado, trouver la dépendance Anne Pelet, Neuchâtel / Marjorie Cosandey Tissot, La Chaux-de-Fonds
A4	Post-Covid : la précision dans l'incertitude Olivia Brailard, Genève / François Héritier, Courfaivre
A5	Céphalées : trouver le bon traitement Aurélien Hacquard, Delémont
A6	Chercher l'antibiotique, trouver la bonne durée Noémie Boillat-Blanco, Lausanne / Nicolas Ochs, Préverenges
11h15 – 11h45	Pause-café
11h45 – 12h45	Séminaires interactifs B (répétition séminaires interactifs A)
B1	Vaccins : trouver le bon moment Amel Filali, Lausanne / Cannelle Broquet, Saignelégier
B2	Chercher des liens et établir un diagnostic sans dermatologue Shireen Dumont, Genève / Idris Guessous, Genève
B3	Chercher l'ado, trouver la dépendance Anne Pelet, Neuchâtel / Marjorie Cosandey Tissot, La Chaux-de-Fonds
B4	Post-Covid : la précision dans l'incertitude Olivia Brailard, Genève / François Héritier, Courfaivre
B5	Céphalées : trouver le bon traitement Aurélien Hacquard, Delémont
B6	Chercher l'antibiotique, trouver la bonne durée Noémie Boillat-Blanco, Lausanne / Nicolas Ochs, Préverenges

*ATTR-CM: cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine; 1. Maurer MS et al. Expert Consensus Recommendations for the Suspicion and Diagnosis of Transthyretin Cardiac Amyloidosis. Circ Heart Fail. 2019 Sep;12(9):e006075; 2. Condoluci A et al. Management of transthyretin amyloidosis. Swiss Med Wkly. 2021 Oct 20;151:w30053. Swiss Medical Weekly - Management of transthyretin amyloidosis (smw.ch), accédé le 09.03.20; 3. Vyndaqel® (Tafamidis): Information professionnelle Vyndaqel® www.swissmedinfo.ch; Les références sont disponibles sur demande. **Versión abreviada de la información profesional Vyndaqel®** (capsules molles à 20 mg: tafamidis méglumine / capsules molles à 61 mg: tafamidis). **Indications:** traitement de l'amylose à transthyrétine chez les patients adultes présentant une cardiomyopathie de type sauvage ou héréditaire (ATTR-CM), afin de réduire la mortalité toutes causes confondues et les hospitalisations d'origine cardiovasculaire. **Posologie:** 1x 61 mg de tafamidis administré par voie orale en prise journalière ou de 80 mg de tafamidis méglumine (administré sous forme de 4 capsules à 20 mg). Peut être réduit à 20 mg de tafamidis méglumine en cas d'intolérance. **Contre-indications:** hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients. **Mises en garde/précautions:** l'efficacité et la sécurité après transplantation d'organe ne sont pas connues. Contient 44 mg de sorbitol. Contraception chez les femmes en âge de procréer, ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement. **Interactions:** induction de CYP2B6 et CYP3A4; inhibition possible de l'UGT1A1; faible potentiel d'inhibition de MDR1 (P gp), OCT2, MATE1, MATE2K, OATP1B1, et OATP1B3. Exposition accrue à la rosuvastatine, un substrat de la BCRP. Il convient de tenir compte des recommandations posologiques pour les substrats de la BCRP sensibles. Inhibition possible de OAT1 et OAT3; réduction possible de la concentration sérique de thyroxine totale sans effet sur la thyroxine libre (T4) ou la TSH. **Effets indésirables:** aucun effet indésirable observé dans les études sur l'ATTR-CM; les effets indésirables suivants ont été observés dans une autre étude: infections des voies urinaires, infections vaginales, diarrhée, douleurs dans la région abdominale supérieure. **Présentations:** capsules molles à 20 mg: 30; capsules molles à 61 mg: 30. Catégorie de vente B. **Titulaire de l'autorisation:** Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich. Pour de plus amples renseignements, voir l'information professionnelle sur le produit, sous www.swissmedinfo.ch. (V006); PP-VYN-CHE-0469 Dec 2022

▼Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire. Pour plus d'informations, se référer à l'information professionnelle/l'information destinée aux patients de Vyndaqel® disponible sous www.swissmedinfo.ch.

Merci aux médecins qui s'investissent jour après jour pour la réinsertion des victimes d'accidents!



Nous saluons la compétence des médecins et l'investissement du personnel soignant ainsi que des employeurs et des intéressés eux-mêmes. Grâce à eux, les assurés sont toujours plus nombreux à retrouver une vie quotidienne normale après un accident. Infos complémentaires sur le case management de la Suva: www.suva.ch/accident.

suva

LES CONTRAIRES
chercher trouver

Programme scientifique

Jeudi 15 juin 2023

12h45 – 14h00	Déjeuner buffet
13h00 – 13h45	Symposiums satellites du midi 1 et 2
13h00 – 13h45	Atelier de pédagogie médicale L'art pour développer les compétences observationnelles et communicationnelles des étudiant-e-s Baptiste Pedrazzini, Echallens / Marie-Claude Boulet, Lausanne
14h00 – 14h45	Exposé principal 2 Diagnostics par intelligence artificielle : meilleurs que les médecins de famille ? Antoine Geissbühler, Genève / Jacques Cornuz, Lausanne
14h45 – 15h00	Remise du Prix de recherche CMPR 2023 et distinction des bénéficiaires de la bourse de démarrage François Héritier, Courfaivre, et lauréats
14h50 – 15h20	Symposium satellite de l'après-midi
15h00 – 15h30	Pause-café
15h30 – 16h15	Exposé principal 3 Chercher l'information, trouver la vérité Michael Balavoine, Chêne-Bourg / Nicolas Senn, Lausanne
16h30 – 17h30	Séminaires interactifs C (une séance)
C1	Cherche-t-on trop les D-dimères ? David Santos, Payerne / Cindy Ottiger-Mankaka, Villars-sur-Glâne
C2	Chercher les troubles du développement Russia Ha-Vinh, Genève / Martine Bideau, Genève
C3	Douleurs articulaires... que chercher ? Eloi Baumgartner, Porrentruy / François Héritier, Courfaivre
C4	Hypertension résistante – trouver le bon traitement Fabien Stucker, Neuchâtel / Marjorie Cosandey Tissot, La Chaux-de-Fonds
C5	Domicile insalubre : que chercher ? Frédéric Regamey, Lausanne / Loïc Lhopitallier, Lausanne
Dès 17h30	Apéritif d'adieu

Laitea® indique le chemin en cas d'anxiété et d'agitation!

Laitea®

Huile de lavande (Silexan®)

Seul anxiolytique à base de plantes dans la LS³



Admis aux caisses

Gélule
1 fois par jour

- Effet anxiolytique comparable à celui du lorazépam et de la paroxétine^{1,2}
- Une fois par jour³
- Non sédatif⁴
- Aisément associable aux contraceptifs^{5,6}
- Contient l'huile de lavande Silexan®

Information professionnelle abrégée Laitea®: C: 1 capsule contient 80 mg d'huile de lavande (Silexan®). I: En cas d'anxiété et d'agitation. P: Les adultes de plus de 18 ans prennent 1 capsule par jour. CI: Hypersensibilité à l'huile de lavande, grossesse, l'allaitement, insuffisance hépatique, personnes moins de 18 ans et patients présentant une intolérance héréditaire au fructose. EI: Fréquent: Eructations, nausées et réactions cutanées allergiques. Rare: Céphalées. Très rare: Fatigue. IA: Aucune connue. P: 14, 28 et 56 capsules. CV: D, admis aux caisses (LS) avec limitation consulter www.spezialitätenliste.ch TA: Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi. Pour de plus amples informations, consulter www.swissmedicinfo.ch

Références: 1. Woelk H, Schläpke S. A multi-center, double-blind, randomised study of the Lavender oil preparation Silexan in comparison to Lorazepam for generalized anxiety disorder. *Phytomedicine* 2010; 17:94-99. 2. Kasper et al. Lavender oil preparation Silexan is effective in generalized anxiety disorder - a randomized, double-blind comparison to placebo and paroxetine. *Int J Neuropsychopharmacol.* 2014 Jun;17(6):859-69. 3. www.swissmedicinfo.ch 4. Mueller WE, Schwab A, Noeldner M, Kasper S, Friedland K. Pharmacological Bases of the therapeutic use of Silexan (Lasea®). *Psychopharmakotherapie* 2015; 22: 3-14. 5. Heger-Mahn D, Pabst G, Dienel A, Schläpke S, Klipping C. No interacting influence of lavender oil preparation silexan on oral contraception using an ethinyl estradiol/levonorgestrel combination. *Drugs R D.* 2014 Dec;14(4):265-72. 6. Doroshyenko O, Rokitta D, Zadayan G, Klement S, Schläpke S, Dienel A, Gramatté T, Lück H, Fuhr U. Drug cocktail interaction study on the effect of the orally administered lavender oil preparation Silexan on cytochrome P450 enzymes in healthy volunteers. *Drug Metab Dispos* 2013; 41:987-993.

Toutes les références peuvent être demandées à Schwabe Pharma.



Schwabe
Pharma AG
From Nature. For Health.

Symposiums satellites

DU MATIN 1

08h00 – 08h45

Obésité : Changeons les perspectives

Chrysoula Papastathi, MD, PhD
Endocrinologue-Diabétologue FMH

Organisé et soutenu par :



DU MIDI 1

13h00 – 13h45

Acné : conseils pratiques pour le traitement et nouveautés

PD Dr Jann Lübke, Nyon

Organisé et soutenu par :

GALDERMA

DU MATIN 2

08h00 – 08h45

Troubles digestifs fonctionnels

La route vers Rome passe par le cerveau ?!
Dr Paul Wiesel, MD.
Médecin spécialiste en gastroentérologie
GastroEpalinges SA, Epalinges

Approches Thérapeutiques
Dr Gian Marco STAMM
Chef de clinique adjoint, service de
gastro-entérologie et d'hépatologie, CHUV

Organisé et soutenu par :



Schwabe
Pharma AG
From Nature. For Health.

DU MIDI 2

13h00 – 13h45

Traitement efficace de la dépression – respectons les besoins des patients

Dr Michel Muscionico

Organisé et soutenu par :



DE L'APRÈS-MIDI

14h50 – 15h20

Comment ne plus rater une Amyloïdose Cardiaque ?

PD Dr Philippe Meyer
Dr Nana Poku

Organisé et soutenu par :



Protégez-vous et ceux que vous aimez contre les piqûres de tiques.



pique-de-tique.ch



Protégez-vous pour vous prémunir des maladies transmises par les piqûres de tiques.



Informez-vous vite sur pique-de-tique.ch

«pique-de-tique.ch» est une campagne de sensibilisation aux tiques et aux maladies transmises par les tiques. Vous trouverez sur ce site des informations complètes à propos des tiques, des moyens de protection contre les piqûres de tiques et des risques liés aux maladies transmises par les tiques.

Prenez contact avec un médecin ou un pharmacien si des symptômes apparaissent suite à une piqûre de tique ou si vous avez des questions à propos de votre santé. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) salue la campagne «pique-de-tique.ch».

Une campagne de:



Cette initiative bénéficie du soutien de:



PI-PISM-CHE-0643 April 2021

NOUVEAUTÉ LA VEILLE
DU CONGRÈS CMPR:
COURS DE
TRAUMATOLOGIE

Clinical Skills Academy Lausanne

TraumatologiePratique
Beaulieu Lausanne
Mercredi 14 juin 2023

TraumatologiePratique
Membres supérieurs
L'épaule, le coude et la main

Formation continue structurée avec
conférences plénières et ateliers pratiques

Accrédité par :
SSMIG 6 crédits
SEMS 6 crédits
Swiss orthopaedics 8 crédits



www.clinical-skills-academy.ch

Nous avons le plaisir de vous inviter à la première Clinical Skills Academy (CSA) qui se tiendra au Beaulieu Lausanne le 14 juin 2023, la veille du congrès du CMPR.

La CSA portera sur la traumatologie des membres supérieurs. Des médecins du sport, des chirurgiens et des traumatologues confirmés partageront leurs précieuses expériences autour de l'épaule, du coude et de la main. La formation propose une série de conférences qui viseront le rafraîchissement des connaissances en matinée puis une série d'ateliers qui permettront d'approfondir les compétences pratiques l'après-midi.

Le comité d'organisation de la CSA
Dr méd. Marc Müller
Dr méd. Michael Schär, PD
Dr méd. Philippe Tscholl


Organisateurs



Inscription :

Medworld AG, 6312 Steinhausen | Mail : registration@medworld.ch | Téléphone : 041 748 23 00

Plan du congrès / Exposants et sponsors



Exposants

	N° Stand
A.Menarini GmbH, Zürich	38
A. Vogel AG, Roggwil TG	23
Alfasigma Schweiz AG, Zofingen	44
Allergopharma AG / Dermapharm AG, Hünenberg	45
AstraZeneca AG, Baar	40
Axon Lab AG, Le Mont-sur-Lausanne	16
Biomed AG, Dübendorf	35
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel	15
Bristol-Myers Squibb SA, Steinhausen	47
Caisse des Médecins société cooperative, Thonex	36
CSL Vifor, Villars-sur-Glâne	26
Dr. Risch, Crissier	21
e-sculape informatique médicale SA, Givisiez	49
Eli Lilly (Suisse) AG, Vernier	1
FMH Fédération des médecins suisses, Berne	FMH
Galderma SA, Zug	14
Galexis SA, Niederbipp	8
GlaxoSmithKline AG, Münchenbuchsee	42
Grünenthal Pharma AG, Mitlödi	17
Handylife AG, Lausanne	19
labor team w ag, Goldach	11
Laboratoire Osler GmbH, Zug	25
Ligue pulmonaire vaudoise, Lausanne	37
LumiraDx, Othmarsingen	18
Lundbeck (Schweiz) AG, Glattbrugg	7
Medbase AG, Romandie	24
Medisupport Services AG, Niderwangen b. Bern	30
mediX romndie, Genève, Vaud, Jura	10
Merz Pharma (Schweiz) AG, Allschwil	13
Moderna Switzerland GmbH, Basel	29

Mylan Pharma GmbH, Steinhausen	9
Nova Biomedical Schweiz, Zürich	5
Novartis Pharma Schweiz AG, Rotkreuz	2
Novo Nordisk Pharma AG, Zürich	12
OM Pharma Suisse SA, Villars-sur-Glâne	39
Oviva AG, Zürich	34
Pari Swiss AG, Cham	4
Pfizer AG, Zürich	32
Pierre Fabre Pharma AG, Allschwil	41
ResMed Schweiz GmbH, Basel	20
Réseau Delta, Onex	46
sanofi-aventis (suisse) sa, Vernier	52
Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi	43
Schülke & Mayr AG, Zürich	22
Soignez-moi.ch, Vevey	53
Spirig HealthCare AG, Egerkingen	31
SYNLAB Suisse SA, Kriens	51
Unilabs SA, Coppet	3
VERFORA SA, Villars-sur-Glâne	31
Viollier AG, Allschwil	6
Voicepoint Romandie, Sàrl Carouge	50
Zambon Schweiz AG, Cadempino	28
Zeller Medical AG, Romanshorn	33

Sponsors

Biomed AG, Dübendorf
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel
Caisse des Médecins société cooperative, Thônex
Eli Lilly (Suisse) SA, Vernier
Galderma SA, Zug
Galexis SA, Niederbipp
Lundbeck (Schweiz) AG, Glattbrugg
Novo Nordisk Pharma AG, Zürich
Pfizer Schweiz AG, Zürich
Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi
SUVA, Luzern

ELLE DONNE TOUT. EN EST-IL DE MÊME POUR SON GIP ?

Avec une fonction réduite de son polypeptide insulinothéropé dépendant du glucose (GIP), ses efforts pourraient être encore insuffisants.^{1,2}

Les patients donnent le meilleur d'eux-mêmes pour gérer leur diabète de type 2. Néanmoins, leurs risques de complications à long terme peuvent encore augmenter si la maladie n'est pas traitée à un stade précoce.^{3,4}

Les recherches actuelles permettent de mieux comprendre le GIP. Cette hormone incrétine pourrait jouer un rôle plus important dans les domaines de la régulation de la glycémie et du poids des patients qu'on ne l'imaginait jusqu'à maintenant.^{1,2,5}

Le GIP pourrait-il combler le gap dans notre compréhension du diabète de type 2?

Pour en savoir plus, consultez le site:



Références: 1. Finan B et al. Reappraisal of GIP Pharmacology for Metabolic Diseases. Trends Mol Med. 2016;22(5):359-76. 2. Samms RJ et al. How May GIP Enhance the Therapeutic Efficacy of GLP-1? Trends Endocrinol Metab. 2020;31(6):440-24. 3. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet. 1998;352(9134):837-53. 4. Laiteerapong N et al. The Legacy Effect in Type 2 Diabetes: Impact of Early Glycemic Control on Future Complications (The Diabetes & Aging Study). Diabetes Care. 2019;42(3):416-26. 5. Mroz PA et al. Optimized GIP analogs promote body weight lowering in mice through GIPR agonism not antagonism. Mol Metab. 2019;20:51-62.

Les spécialistes de la santé peuvent demander les références auprès de l'entreprise en tout temps.

Eli Lilly (Suisse) SA, Ch. des Coquelicots 16, CH-1214 Vernier
www.lilly.ch



Informations générales

Lieu: Beaulieu, Lausanne / **Site Internet:** www.cmpr-congres.ch/cmpr2023

Frais de participation	Carte journalière	
	Inscription jusqu'au 22.05.2023	Inscription à partir du 23.05.2023
Médecins	CHF 140.–	CHF 160.–
Médecins assistant·e·s	CHF 100.–	CHF 120.–
Etudiant·e·s	sans frais	sans frais

Inscription

Inscription en ligne sur www.cmpr-congres.ch Une facture vous sera envoyée qui, une fois réglée, fera office de confirmation d'inscription.

Annulation de l'inscription

En cas d'annulation jusqu'au 22 mai 2023, les frais de dossier d'un montant de CHF 50.– ne seront pas remboursés/resteront dus. En cas d'annulation de l'inscription à partir du 23 mai 2023 ou en cas d'absence, les frais d'inscription ne seront pas remboursés/seront toujours dus.

Patronage scientifique

Collège de Médecine de Premier Recours, Rue de l'Hôpital 15, PF 592, 1701 Fribourg

Organisation administrative

Medworld AG
Andrea Studer | Remo Gabathuler | Beatrice Schnee
Sennweidstrasse 46, 6312 Steinhausen
Tél. : 041 748 23 00
E-mail : registration@medworld.ch
Internet : www.cmpr-congres.ch/cmpr2023

Reconnaissance/Recommandation/Crédits

SSMIG	SSP
Le nombre effectif d'heures de formation suivies est reconnu comme formation continue essentielle	3 crédits

Clinical Skills Academy Lausanne

14 juin 2023 | Traumatologie des membres supérieurs

Pour plus d'informations, consultez le site : www.clinical-skills-academy.ch

Date de parution: Avril 2023

Nouveau:
Admission par les
caisses maladie
pour les personnes à risque
de 65 ans et plus¹



Prevenar 13[®]

Protégez vos petits (jusqu'à 5 ans) et
grands patients (à partir de 65 ans) contre
les **maladies à pneumocoques**.²



RÉFÉRENCE : 1. Office fédéral de la santé publique (OFSP). Liste des spécialités. Berne : OFSP, état mars 2023. 2. Prevenar 13[®] : information professionnelle mise à jour sur www.swiss-medinfo.ch. Les références sont disponibles sur demande.

INFORMATION PROFESSIONNELLE ABRÉGÉE PREVENAR 13[®] : Prevenar 13[®] (vaccin pneumococcique conjugué 13-valent, polysaccharide pneumococcique des sérotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F et protéine porteuse CRM₁₉₇). **Indications :** Immunisation active pour la prévention des maladies invasives, pneumonie et otite moyenne aiguë causées par *Streptococcus pneumoniae* chez les nourrissons et les enfants âgés de 6 semaines à 5 ans. Immunisation active pour la prévention des maladies invasives et des pneumonies causées par *Streptococcus pneumoniae*, chez les adultes ≥65 ans. Prevenar 13 ne protège pas contre les maladies causées par les sérotypes de *S. pneumoniae*, qui ne font pas partie de la composition du vaccin. **Posologie :** Nourrissons âgés de 6 semaines à 6 mois : 3 doses, avec un intervalle d'au moins 1 mois entre les doses, la première dose généralement à l'âge de 2 mois, quatrième dose (rappel) entre l'âge de 11 et 15 mois. Dans le cadre d'un programme de vaccination standard, un autre schéma est possible : la première dose à partir de l'âge de 2 mois, la deuxième dose 2 mois plus tard et la troisième dose (rappel) entre l'âge de 11 et 15 mois. Nourrissons prématurés : primovaccination comportant 3 doses, à un intervalle d'au moins 1 mois, dont la première normalement à l'âge de 2 mois (possible dès l'âge de 6 semaines), avec une quatrième vaccination (de rappel) à l'âge de 11 à 15 mois. Nourrissons non vaccinés âgés de 7 à 11 mois : 2 doses, avec un intervalle d'au moins 1 mois entre les doses, troisième dose au cours de la deuxième année de vie ; enfants non vaccinés âgés de 12 à 23 mois : 2 doses, avec un intervalle d'au moins 2 mois ; enfants non vaccinés âgés de 2 à 5 ans : 1 dose. Adultes ≥65 ans : 1 dose. **Contre-indications :** Hypersensibilité à l'un des principes actifs, à l'un des excipients, ou à l'anatoxine diphtérique. Maladies fébriles aiguës sévères. **Mises en garde/précautions :** Ne doit pas être administré par voie intravasculaire. Réaction anaphylactique. Thrombopénie et autres troubles de la coagulation. Protection limitée dans certaines circonstances/chez certains groupes de personnes ou aucune donnée disponible concernant la sécurité et l'immunogénicité. Contient du sodium. Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans : Risque d'apnées lors de l'administration chez les grands prématurés. Fièvre/traitement antipyrétique. **Interactions :** Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans : Peut être administré avec d'autres vaccins pédiatriques habituels en tenant compte du plan de vaccination suisse. Adultes ≥65 ans : L'administration concomitante avec des vaccins contre la grippe a été évaluée. L'utilisation concomitante avec d'autres vaccins n'a pas été étudiée. **Effets indésirables :** Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans : Appétit diminué, fièvre, irritabilité, érythème, induration/tumefaction, douleur/sensibilité au site d'injection, envie de dormir, sommeil de mauvaise qualité, convulsion (y compris crise convulsive fébrile), e.a. Adultes ≥65 ans : Réactions locales (rougeur, gonflement, douleur, mobilité réduite du bras), fièvre, fatigue, céphalée, frissons, rash, appétit diminué, douleur musculaire, douleur articulaire, e.a. **Présentation :** 1 x 0,5 ml et 10 x 0,5 ml suspension injectable en seringue préremplie. Catégorie de vente B. **Titulaire de l'autorisation :** Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich. Pour de plus amples renseignements, voir l'information professionnelle sur le produit, sous www.swissmedinfo.ch, (V032)

L'illustration avec des personnes montre un exemple fictif et sert à des fins d'illustration.



Pfizer AG
Schärenmoosstrasse 99
8052 Zürich

Carmenthin®

Huile de menthe poivrée WS® 1340 / Huile de cumin WS® 1520



Admis aux caisses (LS)
dès 12 ans

Douleurs?



Ballonnements?



Sensation de réplétion?



Capsule gastro-résistante¹

Se dissout directement dans l'intestin¹

La combinaison unique hautement dosée
d'huile de menthe poivrée et de cumin.¹

Action dans l'intestin. Réduction ciblée des symptômes.

1,2,3,4,5

Information professionnelle abrégée Carmenthin®

C: 1 capsule gastro-résistante contient 90 mg d'huile essentielle de menthe poivrée et 50 mg d'huile essentielle de cumin. Colorants: E 171, E 172, E 131, E 104, sorbitol et autres excipients. I: En cas de troubles digestifs fonctionnels (dyspepsie fonctionnelle) avec douleurs et brûlures dans le creux épigastrique, crampes légères, ballonnements et sensation de réplétion. P: Les adultes et les adolescents à partir de 12 ans prennent 1 capsule sans la croquer 2 fois par jour avec suffisamment de liquide (p. ex. 1 verre d'eau) au moins 30 minutes avant le repas, de préférence le matin et le midi. Le traitement doit être poursuivi jusqu'à l'amélioration des symptômes, en général de 1-2 semaines à 3 mois. CI: Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. Affections hépatiques, calculs biliaires et affections inflammatoires du canal cholédoque (cholangite) ou autres affections des voies biliaires. Patients souffrant d'acholurie. Et: Des troubles gastro-intestinaux, tels que remontées acides, brûlures d'estomac, nausées, vomissements ou dérangements rectaux peuvent survenir. En présence de signes de réaction allergique, il faut arrêter de prendre Carmenthin® et consulter un médecin. IA: En cas de prise concomitante de Carmenthin® avec des antidiabétiques, antistaminiques, inhibiteurs de la pompe à protons, la gélule peut s'ouvrir de manière anticipée (inspecter un intervalle d'au moins 1 heure). GA: L'administration de Carmenthin® durant la grossesse n'est pas recommandée. Il n'existe pas ou peu de données sur l'utilisation de la menthe poivrée et/ou de l'huile essentielle de cumin chez la femme enceinte. Carmenthin® ne doit donc pas être administré pendant la période d'allaitement. P: 28 et 84 capsules. CV: B, admis aux caisses (LS) avec limitation consulter www.specialistenliste.ch. TA: Schwabe Pharma SA, Küssnacht am Rigi. Pour de plus amples informations, consulter www.swissmedinfo.ch.

Références

1. www.swissmedinfo.ch 2. Rich G. et al. A randomized placebo-controlled trial on the effects of MenthaCarin, a proprietary peppermint- and caraway-oil preparation, on symptoms and quality of life in patients with functional dyspepsia. Neurogastroenterol. Motil. 2017; Jul 10. 3. Freise und Köhler et al. Peppermint oil/caraway oil fixed combination in antacid dyspepsia - Comparison of efficacy and tolerance of two galenic preparations. Pharmazie 1999; 54 (3): 201-215. 4. May B. et al. Efficacy and tolerability of a fixed combination of peppermint oil and caraway oil in patients suffering from functional dyspepsia. Aliment Pharmacol Ther 2000; 14: 1671-1677. 5. May B. et al. Efficacy of a Fixed Peppermint Oil/Caraway Oil Combination in Non-ulcer Dyspepsia. Arznei-Forsch./Drug Res. 1996; 36 (II), Nr. 12, 1149-1153. 02/2022

Toutes les références peuvent être demandées à Schwabe Pharma.



Schwabe
Pharma AG

From Nature. For Health.